


Avertissements agricoles



GRANDES CULTURES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES POITOU-CHARENTES

Bulletin n° 172 (01/90) du 19 Janvier 1989

CEREALES	: Vol discret des pucerons vecteurs de la JNO.
COLZA	: Attention aux larves d'altises dans les parcelles non protégées à l'automne.

CEREALES

JAUNISSE NANISANTE

Situation

Des vols de pucerons de très faibles intensités ont été détectés au piège à succion de Biard à la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier.

Les températures restent favorables à la multiplication de ces insectes.

Les risques de colonisation liés à ces vols apparaissent faibles mais non nuls pour des parcelles situées à proximité de repousses infestées.

Préconisation

Parcelles levées avant le 20 novembre n'ayant reçu aucun traitement : des dégâts importants sont déjà commis mais une intervention rapide peut les limiter.

Parcelles ayant reçu un traitement depuis le 10 Décembre : ne pas intervenir.

Parcelles n'ayant pas reçu de traitement depuis le 10 décembre : une observation d'une ou deux parcelles de l'exploitation peut être utile pour vérifier l'absence de pucerons.

Si plus de 2 % des pieds sont contaminés et qu'aucune période froide n'est annoncée avant la fin du mois de janvier, une intervention peut s'avérer nécessaire.

ZABRE

Situation

Des dégâts de larves de ce coléoptère sont observés dans les parcelles de Charente-Maritime, Plaine de Niort, secteur de Thouars (79) et Est de la Vienne.

Préconisation

Se reporter au bulletin n° 21 du 28 novembre 1989.

OIDIUM

Situation

Les levées précoces d'orges et de blés présentent localement des infestations d'oïdium importantes.

P.1



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL
DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
13, Rte de la Forêt - BIARD
86000 POITIERS Tél. : 49.58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes
Directeur Gérant : J. P. PIQUEMAL
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel :
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

4° Jo 40830

1990 172-192 up 173

Préconisation

Les résultats d'essais de traitement courant tallage réalisés au cours de l'année passée n'ont pas permis de dégager un intérêt régulier de ce type d'intervention.

Il convient de reporter ses efforts au début montaison où la maladie paraît plus nuisible.

*MOSAÏQUE DE L'ORGE*Situation

Des symptômes de la maladie sont observables actuellement.. De nouveaux foyers ont été détectés dans le secteur d'Ayron (86).

Préconisation

Seule l'utilisation de variétés tolérantes parmi lesquelles Express est la plus cultivée permet de lutter contre cette maladie.

*OSCINIES*Situation

Des dégâts d'oscinies sont toujours observés en toutes zones. Ces dégâts sont souvent **attribués à tort** à la mouche grise quasi absente de notre région.

COLZA*LARVES D'ALTISES*Situation

Les sondages réalisés en janvier sur la région mettent en évidence des populations larvaires très faibles sur toutes les parcelles protégées à l'automne.

Dans les parcelles n'ayant pas reçu de traitement contre les adultes, on peut observer jusqu'à 90 % de pieds atteints.

Préconisation

Parcelles traitées à l'automne : ne pas intervenir.

Parcelles non traitées à l'automne : il est indispensable de faire un sondage et d'intervenir avec un oléoparathion si vous avez deux pieds sur trois avec des dégâts de larves d'altises (localisés sur les pétioles).

CHARANCONS DE LA TIGE

Les conditions météorologiques de ces derniers mois laissent prévoir un envahissement précoce des parcelles de colza dès que nous aurons des journées douces et ensoleillées. Il est indispensable de mettre en place les cuvettes jaunes pour détecter le début du vol.

(C) SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.